

BETEGTÁJÉKOZTATÓ **Fluval AB vakcina adásáról**

Kedves Betegünk!

Az eljárás célja:

Az oltóanyag az influenza megbetegedések megelőzésére alkalmas. Javasolt használata mindazok részére, akik el akarják kerülni az influenza vírus okozta megbetegedéseket és a fertőzés következtében esetlegesen fellépő szövődményeket. Az oltóanyag azon influenzatörzsek okozta megbetegedésektől véd, amelyek antigén szerkezete ugyanolyan, vagy hasonló a vakcinába beépített prototípus törzsekhez. Egyéb kórokozók által kiváltott influenzaszerű megbetegedések ellen nem nyújt védelmet.

Az eljárás technikája:

Az immunizálás egyszeri oltással történik. A védettség kb. 2 hét alatt fejlődik ki és több hónapig tart, célszerű az oltást a járványidőszakot megelőzően elvégezni.

Az oltóanyagot steril fecskendővel és tűvel az izomzatba (felkar) adjuk be.

Heveny, lázas megbetegedés esetén az oltóanyag csak a tünetek elmúltá után 2-3 nappal adható.

3 évesnél fiatalabb gyermek oltása nem ajánlott. Terhes nők oltása az influenza megbetegedés és következményeinek, valamint a védőoltás nem kívánt mellékhatásainak mérlegelése alapján javasolt.

A védőoltás beadása előtt az alábbiakról a kezelőorvost tájékoztatni kell:

- Allergiás betegségekről
- Immunszuppresszív készítmények alkalmazásáról

Az eljárás esetleges veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:

1. A beadás helye körül előfordulhat bőrpír, mely általában 48 órán belül kezelés nélkül is megszűnik.

2. Általános mellékhatások: láz, rossz közérzet, izomfájdalom nagyon ritkán előfordulhat. Ezek a reakciók az oltóanyag beadását követően 6-12 órával alakulhatnak ki, és 1-2 napig tarthatnak. Azonnal kialakuló allergiás sokk azon egyéneknél észlelhető, akik tojásfehérjére vagy az oltóanyag más összetevőjére érzékenyek. Az allergiás sokk elhárítására a háziorvosi praxisok fel vannak készülve.

A beavatkozás elmaradásának veszélyei és más eljárási lehetőségek:

Influenza betegség kialakulása. Az influenza megelőzésére más eljárás jelenleg nem áll rendelkezésre.