

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Tetanusz vakcina adásáról

Kedves Betegünk!

Az eljárás célja:

- 2 hónapos, vagy idősebb csecsemők, gyermekek, serdülők és felnőttek tetanusz elleni aktív immunizálása
- tetanusz megelőzése sérülés esetén.

Az eljárás technikája:

Az 1940. december 31. után születettek alapimmunizálásban és emlékeztető oltásban részesültek, ezen sérültek számára elegendő tetanusz anatoxin adása.

Az oltóanyagot mélyen az izomba szükséges beadni, indokolt esetben (pl. véralvadási zavarok) a készítmény bőr alá is adható.

Az eljárás esetleges veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:

Gyakrabban előforduló mellékhatások: az oltás helyén átmeneti bőrpír, duzzanat és fájdalom, esetenként a környéki nyirokcsomók megduzzadásával. Elvértve az oltás helyén kisméretű, nem fájdalmas csomó képződhet, amelyben néha savó halmozódhat fel.

Ritkán előforduló mellékhatások: influenzára emlékeztető általános tünetek (fejfájás, keringési rendellenességek, fokozott verejtékezés, hidegrázás, láz, neheztett légzés, izom és ízületi fájdalmak, emésztési panaszok, allergiás reakciók, a bőr kivörösödése.

Elvértve előforduló mellékhatások: súlyos esetben légzésbénulás, a perifériás idegrendszer egyes részeinek gyulladása, a vérlemezkek számának átmeneti csökkenése, allergiás vesebántalmak és emiatt fehérje megjelenése a vizeletben.

A beavatkozás elmaradásának veszélyei és más eljárási lehetőségek:

A tetanusz kialakulása halálos kimenetelű betegséghez vezet. E betegség megelőzésére a védőoltáson kívül más eljárás nem áll rendelkezésre.